Maus Mäuse Mäuse Mäuse Mäuse Mäuse

LAZBW

Wurth-32-Grünlandwirtschaft Aulendorf

Wühlmäuse

- Scharfe Schaufelzähne
- 12-22 cm Körperlänge
- 7-11 cm Schwanzlänge
- kurze Ohren im Fell
- 80 bis 270 Gramm
- 2-4 Jahre alt
- frisst täglich eigenes Gewicht an Wurzeln
- 1 Paar 50 m Bau
- 5 Würfe/Jahr, bis 8 Jungtiere/Wurf
- Geschlechtsreife nach 3 Monaten
- 1 Pärchen: bis 500 Mäuse je Jahr

- 9-12 cm Körperlänge
- 3-4 cm Schwanzlänge
- kurze Ohren
- 18-40 Gramm
- 1,5-3 Jahre alt
- frisst Wurzeln, Blätter, Körner
- weit verzweigtes Gang-system
- oberirdische Laufwege
- 6-8 Würfe/Jahr, bis 10 Jungtiere/Wurf
- Geschlechtsreife nach 12 Tagen
- 1 Pärchen: bis 1500 Mäuse je Jahr

- Vorderfüße als Grabschaufeln
- 12-16 cm Körperlänge
- 2-4 cm Schwanzlänge
- keine Ohrmuscheln
- 60-120 Gramm
- 3-4 Jahre alt
- frisst Insekten und Würmer, dazu gräbt er täglich 10-20 m
- im Jahr nach der Geburt geschlechtsreif
- 1 Pärchen: bis 6 Jungtiere je Jahr

Wühlmäuse

LAZBW

Wurth-32-Grünlandwirtschaft Aulendorf

den Mäusen auf die Pelle rücken

Quelle: Sommerer, LRA Ravensburg

- ✓ Nützlinge fördern

Mäuse Bekämpfung

siehe Integrierter Pflanzenschutz 2021, Ackerbau und Grünland, Seite 21

vor einer chemischen Bekämpfung sind vorbeugende Maßnahmen durchzuführen

- ✓ Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel
- ✓ Mulchen von Ackerrandstreifen und Gräben
- ✓ Weidenutzung behindert die Mäuse
- ✓ kurze Bestände vor dem Winter
- ✓ Bodenbearbeitung auf stark befallenen Flächen

Bekämpfungsrichtwert

nach wiedergeöffneten Löchern

Vorgehen:

1. 2 x 250 m^2 abstecken
2. alle Löcher zutreten
   nach 24 h
3. die wieder geöffneten Löcher (wgL) zählen.

Bekämpfungsrichtwerte für Feldmäuse:

mehrjährige Futterkulturen	nach 1. Schnitt:	5 wgL
	nach 2. Schnitt:	11 wgL
Wintergetreide/Raps;	Okt-Mai:	5-8 wgL
	Anfang Mai:	5-6 wgL
andere Kulturen:		5-10 wgL

Mäuse Bekämpfung

aus Integrierter Pflanzenschutz 2021, Ackerbau und Grünland, Seite 21

MITTEL ZUR FELD- UND SCHERMAUSBEKÄMPFUNG				
Mittel (Beispiele)	**Wirkstoff**	**Kultur**	**Aufwandmenge**	**Anwendungshinweise**
Feldmaus				
Ratron Giftweizen/Arvalin	Zinkphosphid Fertigköder	Ackerbaukulturen, Wiesen und Weiden	5 Stück / Loch max. Aufwand-menge 2 kg/ha	verdecktes Auslegen; max. 1 Anwendung pro Jahr; eine Aufteilung der Behandlung in einzelne Teilbehandlungen ist möglich
Ratron Gift-Linsen	Zinkphosphid Granulatköder	Ackerbaukulturen Wiesen und Weiden	5 Stück / Loch max. Aufwand-menge 2 kg/ha	verdecktes Auslegen; max. 1 Anwendung pro Jahr; eine Aufteilung der Behandlung in einzelne Teilbehandlungen ist möglich
			100 g / Köderstelle	Auslegen in geeigneten Köderstationen, max. 1 Anwendung pro Jahr
Schermaus				
Ratron Schermaus-Sticks	Zinkphosphid Blockköder	Ackerbaukulturen, Wiesen und Weiden	1 Stück je 3-5 m Ganglänge	verdecktes Auslegen; Giftköder kann auch mit dem Schermauspflug ausgebracht werden; max. 1 Anwendung pro Jahr
			1 Stück / Köderstelle	Auslegen in geeigneten Köderstationen
Wühlmausköder	Zinkphosphid Fertigköder	Wiesen und Weiden	5 g je 8-10 m Ganglänge	verdecktes Auslegen

keine Anwendung auf vegetationslosen Flächen
- … in Natura 2000 Gebieten (FFH-, Vogelschutzgebieten)
- … an Rastplätzen von Zugvögeln während des Vogelzugs
- … bei nachgewiesenem Vorkommen des Feldhamsters
- … bei nachgewiesenem Vorkommen der Haselmaus in einem Umkreis von 25 um Bäume, Gehölze, Hecken zw. 01.03. und 31.10.
- … bei nachgewiesenem Vorkommen der Birkenmaus zw. 01.03. und 31.10.

den Mäusen auf die Pelle rücken

Quelle: Sommerer, LRA Ravensburg

- ✓ **Nützlinge fördern**
- ✓ **Fangen**

LAZBW

den Mäusen auf die Pelle rücken

Quelle: Sommerer, LRA Ravensburg

- ✓ **Nützlinge fördern**
- ✓ **Fangen**
- ✓ **Vergrämen**
- ✓ **Vergiften**

- Blutgerinnungshemmer
- Zinkphosphid,
- Mäuse sterben innerhalb von Tagen
- nicht für Biobetriebe

den Mäusen auf die Pelle rücken

Quelle: Sommerer, LRA Ravensburg